

Recommendations

- NSAID-type medications may cause renal failure and should be avoided.
- While performing CT test, it is recommended to avoid usage of intravenous injected contrast material, unless confirmed by the hematologist.
- In some cases, mainly after Stem Cell Transplant, blood products should be irradiated prior to administration.
- Invasive dental procedures may be harmful in Bisphosphonate users.
- Consult your physician about getting a pneumococcal vaccination (pneumonia vaccine) once per 5 years.

In case of emergency please notify:

Telephone number:

The carrier of this card is a
Multiple Myeloma (MM) patient



Recomendaciones

- El tratamiento medicamentoso tipo Anti Inflamatorios No Esteroideos (AINES/NSAID) puede conducir a un fallo fatal de los riñones y se tendría que evitar.
- Sin la confirmación de un hematólogo (especialista de sangre), en caso de una Tomografía (CT), se tendría que evitar el uso de una inyección de sustancia del contraste.
- En muchos casos, especialmente después de un trasplante de células madre se tendría que utilizar transfusiones de sangre radiadas antes del uso.
- Un tratamiento invasivo dental puede perjudicar al paciente con tratamiento bifosfonato.
- Consulte con un medico de confianza acerca de la vacuna Pneumokokken que se pone cada cinco años.

En caso de urgencia informar a:

Número de Teléfono:

El portador de esta carta es un
paciente Mieloma múltiple (MM)



Recommendations

- La médication type NSAID peut provoquer une défaillance de la fonction rénale et doit être évitée.
- Sans confirmation d'un hématologue lors d'un CT l'application intraveineuse d'une substance de contraste doit être évitée.
- D'habitude, en particulier après une greffe de cellules souches, les conserves de sang doivent subir un traitement par radiation.
- Des soins dentaires invasifs peuvent être nuisibles pour des patients.
- Consulter votre médecin pour une vaccination contre le pneumocoque tous les 5 ans.

En cas d'urgence informez s.v.p.:

N° téléphone:

Le porteur de cette carte est un
patient de Myélome Multiples (MM)



Tavsiyeler

- Non steroid Anti inflamatuvar türü ilaçlar böbrek yetmezliğine yol açabilir ve önlenmelidir.
- BT çekilirken, hematoloğunuzun onayı olmadan kontrast medyanın damar içine verilmemesi tavsiye edilmektedir.
- bazı durumlarda, öm. Kemik iliği nakli sonrasında kan ürünleri kullanımdan önce ışınlanmalıdır.
- Bifosfanat kullananlar için invaziv diş ameliyatları zararlı olabilir.
- Pnömoni aşısı yaptırmak için (5 senede 1 kez) doktorunuza danışınız.

Acil durumlarda bu kişiye haber verilecek:

Telefon numarası:

Kart sahibi multipl
myelom hastası (MM)

